

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

Tél. 88-30-34

88-06-15

ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDÉE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

Poste 571

15 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars. - ANGERS
C. C. P. Nantes 86-04-02

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 67 D'AVRIL - INDRE-et-LOIRE - MAINE-et-LOIRE - LOIRE-
ATLANTIQUE - VENDEE - VIENNE P 17

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER - Les premières taches sont apparues depuis le 10 avril et de nouvelles taches doivent apparaître incessamment. Les ascospores sont toujours très nombreuses et les dernières pluies ont diminué considérablement l'efficacité du traitement conseillé dans la note du 7 avril dernier. En conséquence, il y a lieu d'effectuer sur toutes les variétés un nouveau traitement dès réception de cette note.

TAVELURE DU POMMIER - Bien que les premières taches n'aient pas encore été observées, la situation est identique à celle qui existe pour la tavelure du poirier. Il y a donc lieu d'effectuer un nouveau traitement sur toutes les variétés dès réception de cette note.

I M P O R T A N T

La période actuelle est très dangereuse pour les tavelures du pommier et du poirier. Il est rappelé qu'en cas de précipitations abondantes ayant lessivé un traitement, la protection doit être renouvelée immédiatement, sans attendre de nouvelles informations de la Station.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Les conditions climatiques deviennent plus favorables à ce parasite. Profiter du traitement anti-tavelure pour assurer la protection contre cette maladie.

PUCERONS DU POMMIER ET DU POIRIER - Extension des foyers non combattus. Là où ils auront été repérés, ajouter à la bouillie anti-tavelure un produit aphicide.

HOPLOCAMPE DU POMMIER - Ce parasite peut occasionner parfois et localement des dégâts importants. Dans les vergers où il se sera manifesté gravement l'année dernière, le combattre à la chute des pétales à l'aide d'un insecticide à base d'esters phosphoriques, d'H.C.H. ou de Lindane. Ce traitement pourra être mixte avec une protection anti-tavelure.

ARAIGNEE ROUGE - Les éclosions d'oeufs d'hiver sont de plus en plus nombreuses mais sont loin d'atteindre la totalité. Dans les vergers où les pontes sont très abondantes et où aucun traitement d'hiver n'a été exécuté, on peut effectuer un traitement à l'aide d'un acaricide homologué pour protéger la floraison. Dans les autres vergers attendre des nouvelles informations.

ARBRES FRUITIERS A NOYAUX - Continuer d'assurer les traitements suivant les indications des bulletins n° 66 et 67. Se méfier particulièrement des maladies cryptogamiques, du Monilia en particulier.

L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux : J. DIXMERAS.

Les "Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles : R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

Tirage du 15 Avril 1966 - 2 770 EXEMPLAIRES.

33